

胃の健康度 ABC 分類検査チャート 改訂のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、弊社「胃の健康度 ABC 分類 検査チャート」につきまして、見直しを行い次のように改訂させて頂くことになりましたのでお知らせ申し上げます。

何卒宜しくご了承の程、お願い申し上げます。

謹白



● 「胃の健康度 ABC 分類 検査チャート」改訂内容

● 該当の分類に*を印字

紙面右側の群別判定コメント欄に*を印字し、図の上部に「*印で示した分類があなたの検査結果です」と記載いたします。

● 判定コメントの改訂

日本ヘリコバクター学会より出された『「血清抗 H.pylori IgG 抗体検査」の陽性・陰性判定に関する日本ヘリコバクター学会からの注意喚起』を受けて、判定コメントを改訂いたします。

変 更 日 2015 年 5 月 1 日 (金) 報告分より

裏面に続きます

株式会社 **ビー・エム・エル**

本社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3

総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市の場 1361-1

☎ 049(232)3131 FAX 049(232)3132

検査項目検索用
アプリ B-Book



Google play



Available on the
App Store



電子カルテはビー・エム・エル



《従来 胃の健康度ABC分類 検査チャート》

胃の健康度ABC分類 検査結果チャート

000-19 54992-00 BML-CPU TEST
受付No. 000-0006 カルテNo. KARTE-123456789
採取日 '15年 4月 20日 氏名 川越 太郎 性別 男・検
受付日 '15年 4月 20日 年齢 15歳 性別 男・検
報告日 '15年 4月 22日 科名 内科 外・検
担当 TANTO-123456789先生 病棟 BYOTO-123789789 ABC検診・検診結果報告

検査項目	測定結果	判定	ABC分類
ヘリコバクター・ピロリ抗体	7.4 U/mL	(-)	A
ペプシノゲンⅠ	47.5 ng/mL	(-)	
ペプシノゲンⅡ	15.2 ng/mL		
ペプシノゲンⅠ/Ⅱ 比	3.1		

陽性判定基準
ヘリコバクター・ピロリ抗体
10.0U/mL以上
ペプシノゲン
ペプシノゲンⅠ値が70.0ng/mL以下かつ
ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が3.0以下

胃の健康度 ABC検診とは…
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌の抗体価検査と胃粘膜萎縮（老化）マーカーのペプシノゲン検査とを組み合わせて、胃の健康度をABCの3群に分類するのがABC分類です。このABC分類を用いて、胃の健康度に応じた検診間隔を設定し、効率的に検診を行う方法がABC検診です。
※ ABCDの4群に分類するABCD検診もあります。

<ABC分類に適さない方>
・胃の病気の治療中の方
・胃切除後の方
・胃酸を抑える薬を服用中の方
・腎不全の方
・ヘリコバクター・ピロリ菌除菌治療を受けた方
これらに該当する方は医療機関にご確認、ご相談ください。

ABC分類 (ABCD分類)	ヘリコバクター・ピロリ抗体価 検査	
	(-)	(+)
ペプシノゲン 検査	(-)	A B
	(+)	D (C) C

A群

健康的な胃粘膜で胃の病気になる危険性は低いと考えられます。ただし、逆流性食道炎に注意しましょう。

B群

少し弱った胃です。胃潰瘍・十二指腸潰瘍などに注意しましょう。

C群

弱った胃で、胃がんなどの病気になるやすい群です。内視鏡による定期的な検査を受け胃の病気の早期発見・早期治療に努めましょう。

D群(C群)

かなり弱った胃で、胃がんなどの病気になるリスクがあります。内視鏡による定期的な検査をおすすめします。

ヘリコバクター・ピロリ抗体価検査とは…
胃がヘリコバクター・ピロリ菌に感染していないかを調べる検査です。ヘリコバクター・ピロリ菌は胃酸の分泌や胃粘膜の免疫能の働きが不十分な幼小児期（4～5歳）頃までに感染すると考えられています。子供の頃に感染しなかった場合、大人になってから感染することは稀だと言われています。

ペプシノゲン検査とは…
食べ物の消化に関与する「ペプシノゲン」という物質の血中濃度を調べることで胃粘膜の萎縮（老化）の状態を客観的に調べる検査です。

BML 株式会社ビー・エム・エル

赤色点線の枠内が今回の改訂内容です。

《改訂後 胃の健康度ABC分類 検査チャート》

胃の健康度ABC分類 検査チャート

000-19 54992-00 BML-CPU TEST
受付No. 000-0006 カルテNo. KARTE-123456789
採取日 '15年 5月 20日 氏名 川越 太郎 性別 男・検
受付日 '15年 5月 20日 年齢 15歳 性別 男・検
報告日 '15年 5月 22日 科名 内科 外・検
担当 TANTO-123456789先生 病棟 BYOTO-123789789 ABC検診・検診結果報告

検査項目	測定結果	判定	ABC分類
ヘリコバクター・ピロリ抗体	7.4 U/mL	(-)	A
ペプシノゲンⅠ	47.5 ng/mL	(-)	
ペプシノゲンⅡ	15.2 ng/mL		
ペプシノゲンⅠ/Ⅱ 比	3.1		

陽性判定基準
ヘリコバクター・ピロリ抗体
10.0U/mL以上
ペプシノゲン
ペプシノゲンⅠ値が70.0ng/mL以下かつ
ペプシノゲンⅠ/Ⅱ比が3.0以下

胃の健康度 ABC検診とは…
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌の抗体価検査と胃粘膜萎縮（老化）マーカーのペプシノゲン検査とを組み合わせて、胃の健康度をABCの3群に分類するのがABC分類です。このABC分類を用いて、胃の健康度に応じた検診間隔を設定し、効率的に検診を行う方法がABC検診です。
※ ABCDの4群に分類するABCD検診もあります。

<ABC分類に適さない方>
・胃の病気の治療中の方
・胃切除後の方
・胃酸を抑える薬を服用中の方
・腎不全の方
・ヘリコバクター・ピロリ菌除菌治療を受けた方
これらに該当する方は医療機関にご確認、ご相談ください。

ABC分類 (ABCD分類)	ヘリコバクター・ピロリ抗体価 検査	
	(-)	(+)
ペプシノゲン 検査	(-)	A B
	(+)	D (C) C

A群

* 健康的な胃粘膜で、胃の病気になる危険性は低いと考えられます。急のために、一度は内視鏡検査等の画像検査を受けることが理想的です。

B群

少し弱った胃粘膜です。胃かいよう・十二指腸かいようなどに注意しましょう。一度、内視鏡検査を受けましょう。

C群

弱った胃粘膜です。胃がんなどの病気になるやすいタイプ。内視鏡検査を受けましょう。また、定期的な内視鏡検査をお勧めします。

D群(C群)

かなり弱った胃粘膜です。胃がんなどの病気になるリスクがあります。かならず、内視鏡検査を受けましょう。また、毎年、内視鏡検査を受けましょう。

ヘリコバクター・ピロリ抗体価検査とは…
胃がヘリコバクター・ピロリ菌に感染していないかを調べる検査です。ヘリコバクター・ピロリ菌は胃酸の分泌や胃粘膜の免疫能の働きが不十分な幼小児期（4～5歳）頃までに感染すると考えられています。子供の頃に感染しなかった場合、大人になってから感染することは稀だと言われています。

ペプシノゲン検査とは…
食べ物の消化に関与する「ペプシノゲン」という物質の血中濃度を調べることで胃粘膜の萎縮（老化）の状態を客観的に調べる検査です。

BML 株式会社ビー・エム・エル