Information
No.2022-12　Date 2022.3
BML

総合検査依頼書及び総合検査報告書 改訂のお知らせ

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、弊社総合検査依頼書及び総合検査報告書において、検査項目の統合や検査の受託中止に伴い、内容を一部変更させていただきます。
従来の総合検査依頼書も引き続き使用可能ですが、ご依頼の際は変更内容を参照の上、ご使用ください。
先生方にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

謹白

記

変更対象

● 総合検査依頼書、総合検査報告書　等

変 更 日　2022年4月より順次変更

【変更内容】

①検査項目の統合・中止に伴い、総合検査依頼書の項目の配置を変更いたします。

②アルブミン（Alb）とA/G比については、総合検査依頼書と総合検査報告書に掲載されている項目をBCG法による項目からBCP改良法による項目に変更し、それに伴い総合検査報告書の基準値も変更いたします。

③総合検査報告書から受託中止となった項目であるLD（LDH）/JSCCとALP/JSCCを削除し、空欄に変更いたします。

④総合検査報告書の裏面に記載されている報告書コメント内容に「＄ 溶血の為参考値」を追加いたします。

次ページに続きます

株式会社 ビー・エム・エル
本　　社：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-21-3
総合研究所：〒350-1101 埼玉県川越市的場 1361-1
☎ 03(6629)7386　FAX 049(232)3132

検査項目検索用アプリ B-Book
Google play　Available on the App Store
電子カルテはビー・エム・エル Qualis Medical Station

依頼書見本（例：総合検査依頼書）

新　　従来

掲載項目変更



項目の並び順を変更



項目の並び順を変更
&
AIRSの項目追加



BNP血漿項目追加
&
尿素呼気試験の
保存条件追加

報告書見本（例：総合検査報告書）

新

項目名	基準値	単位	結果
総蛋白(TP)	6.5～8.2	g/dL	TP
A/G比 BCP改良法	1.2～2.2		A/G
アルブミン(Alb)BCP改良法	3.8～5.2	g/dL	Alb
総ビリルビン	0.3～1.2	mg/dL	T-Bil
直接ビリルビン	0.4以下	mg/dL	D-Bil
ALP/IFCC	38～113	U/L	ALP/IFCC
LD(LDH)/IFCC	120～245	U/L	LD/IFCC
AST(GOT)	10～40	U/L	AST
ALT(GPT)	5～45	U/L	ALT
γ-GT(γ-GTP)	M 79以下 F 48以下	U/L	γ-GT
コリンエステラーゼ	M245～495 F198～452	U/L	Ch-E
LAP	30～78	U/L	LAP

従来

項目名	基準値	単位	結果
総蛋白(TP)	6.5～8.2	g/dL	TP
A/G比	1.30～2.00		A/G
アルブミン(Alb)	3.7～5.5	g/dL	Alb
総ビリルビン	0.3～1.2	mg/dL	T-Bil
直接ビリルビン	0.4以下	mg/dL	D-Bil
ALP/IFCC	38～113	U/L	ALP/IFCC
LD(LDH)/IFCC	120～245	U/L	LD/IFCC
AST(GOT)	10～40	U/L	AST
ALT(GPT)	5～45	U/L	ALT
γ-GT(γ-GTP)	M 79以下 F 48以下	U/L	γ-GT
ALP/JSCC	104～338	U/L	ALP/JSCC
LD(LDH)/JSCC	120～245	U/L	LD/JSCC
コリンエステラーゼ	M245～495 F198～452	U/L	Ch-E
LAP	30～78	U/L	LAP

※この他の報告書についても同様に変更いたします。

報告書裏面の報告書コメント

「＄ 溶血の為参考値」が追加となります。

生化学

記号	コメント
A	再検済
B	溶血が認められました
C	乳びが認められました
D	測定感度以下
E	凝固の為
ニ	希釈1000倍
マ	凍結の為
ミ	採取法を確認してください
ン	採血量過剰
＄	溶血の為参考値

血液学

記号	コメント
A	再検済
B	溶血が認められました
C	乳びが認められました
D	測定感度以下
E	凝固の為
ヘ	ATYPICAL LYMPHOCYTE
ホ	BLAST
ラ	凝集有り
ン	採血量過剰
＄	溶血の為参考値

尿検査

記号	コメント
A	再検済
B	溶血が認められました
D	測定感度以下
F	フィブリン析出
G	参考値
マ	凍結の為
ヤ	RBC 1万以下
ユ	RBC 1～2万
ヨ	RBC 多数
＄	溶血の為参考値